



## ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 08.04.2025  
Αριθ. πρωτ.: 96159

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ  
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη  
Τηλέφωνο: 210 9287160  
e-mail: [dmakrogianni@minagric.gr](mailto:dmakrogianni@minagric.gr)

Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.  
Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττικής  
e-mail: [leda.zacharopoulou@syngenta.com](mailto:leda.zacharopoulou@syngenta.com)

**ΘΕΜΑ:** «Διεύρυνση της αριθμ. 60704 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORTIVA TOP 20/12,5 SC (azoxystrobin 20% β/ο + difenoconazole 12,5% β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

## ΑΠΟΦΑΣΗ

## Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
  - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
  - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών.» (Α'91/14.06.2024).
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με την «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 1881/286212/13.10.2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19.10.20).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 5702/77151/26.09.2018 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθμ. 60704 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORTIVA TOP 20/12,5 SC (azoxystrobin 20% β/ο + difenoconazole 12,5% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθμ. 24131/28.01.2025 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Διευρύνουμε την αριθμ. 60704 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORTIVA TOP 20/12,5 SC (azoxystrobin 20% β/ο + difenoconazole 12,5% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθμ. 5702/77151/26.09.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

#### 5 Φάσμα δράσης

| Πεδίο Εφαρμογής     | Στόχος                                                                                                              | Δόσεις σκευάσματος |                            |                            | Τρόπος και χρόνος εφαρμογής                                                                                                                                                                    | Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες) |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                     | κ.εκ./ στρέμμα     | κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού | Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ |                                                                                                                                                                                                |                                                                        |
| Ρύζι<br>ORYSA       | Πυρικούλάρια<br><i>Pyricularia oryzae</i><br>PYRIOR<br><br>Ελμινθοσπορίωση<br><i>Helminthosporium</i> sp.<br>HELMSP | 80-100             | --                         | 20-40                      | Ψεκασμός φυλλώματος κατά το άνοιγμα του φύλλου σημαία έως την έναρξη της άνθησης (BBCH 47-61)                                                                                                  | 2/15                                                                   |
| Κουνουπίδι<br>BRSOB | Αλτερνάρια<br><i>Alternaria brassicae</i><br>ALTEBA                                                                 | 100                | --                         | 20-60                      | Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από το στάδιο έναρξης σχηματισμού των κεφαλών έως και την εμφάνιση των πρώτων κλειστών ανθέων (BBCH 40-55)            | 2/14                                                                   |
| Λάχανο<br>BRSOL     | Αλτερνάρια<br><i>Alternaria brassicae</i><br>ALTEBA                                                                 | 100                | --                         | 20-60                      | Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από το στάδιο έναρξης σχηματισμού των κεφαλών έως ότου αυτές αποκτήσουν το τυπικό τους σχήμα και μέγεθος (BBCH 40-49) | 2/14                                                                   |

|                        |                                                                                                                                                            |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                                      |      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Μπρόκολο<br>BXHSS      | Αλτερνάρια<br><i>Alternaria brassicae</i><br>ALTEBA                                                                                                        | 100 | --  | 20-60  | Ψεκασμός<br>φυλλώματος<br>προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων.<br>Από το στάδιο<br>έναρξης σχηματισμού<br>των κεφαλών έως και<br>την εμφάνιση των<br>πρώτων κλειστών<br>ανθέων<br>(BBCH 40-55)              | 2/12 |
| Σέλερυ<br>APUGD        | Σεπτορίωση<br><i>Septoria apii</i><br>SEPTAP<br><br>Ωίδιο<br><i>Erysiphe heraclei</i><br>ERYSHE<br><br>Αλτερνάρια<br><i>Alternaria dauci</i><br>ALTEDA     | 100 | --  | 20-100 | Ψεκασμός<br>φυλλώματος<br>προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων. Από<br>την έναρξη<br>ανάπτυξης του<br>φυλλώματος έως<br>ότου φθάσει στο 80%<br>του τυπικού του<br>μεγέθους και μορφής<br>(BBCH 40-48)        | 3/14 |
| Καρότο<br>DAUCS        | Αλτερνάρια<br><i>Alternaria dauci</i><br>ALTEDA<br><br>Ωίδιο<br><i>Erysiphe heraclei</i><br>ERYSHE<br><br>Σεπτορίωση<br><i>Septoria apiicola</i><br>SEPTAP | 100 | --  | 20-60  | Ψεκασμοί<br>φυλλώματος.<br>Προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων.<br>Από την έναρξη<br>ανάπτυξης των ριζών<br>(διάμετρος> 0.5 εκ)<br>έως ότου φθάσουν<br>στο τυπικό τους<br>μέγεθος και μορφή<br>(BBCH 40-49) | 3/14 |
| Παστινάκι (Α)<br>PAVSA | Αλτερνάρια<br><i>Alternaria dauci</i><br>ALTEDA                                                                                                            | 100 | 100 | 20-60  | Ψεκασμοί<br>φυλλώματος.<br>Προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων.<br>Από την έναρξη<br>ανάπτυξης των ριζών<br>(διάμετρος> 0.5 εκ)<br>έως ότου φθάσουν<br>στο τυπικό τους<br>μέγεθος και μορφή<br>(BBCH 40-49) | 3/14 |

|                                              |                                                                                                                                                                           |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                               |      |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Φινόκιο (Α)<br>(Μαραθόριζα)<br>FOEVA         | Σεπτορίωση<br><i>Septoria apii</i><br>SEPTAP<br><br>Αλτερνάρια<br><i>Alternaria dauci</i><br>ALTEDA                                                                       | 100 | 100 | 20-100 | Ψεκασμός<br>φυλλώματος<br>προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων. Από<br>την έναρξη<br>ανάπτυξης του<br>φυλλώματος έως<br>ότου φθάσει στο 80%<br>του τυπικού του<br>μεγέθους και μορφής<br>(BBCH 40-48) | 2/10 |
| Αγγούρι (Α)<br>CUMSA                         | Ωίδιο<br><i>Erysiphe<br/>cichoracearum</i><br>ERYSCI<br><i>Sphaerotheca<br/>fuliginea</i><br>SPHRFU<br><br>Κλαδοσπορίωση<br><i>Cladosporium<br/>cucumerinum</i><br>CLADCU | 100 | 100 | 50-150 | Ψεκασμός<br>φυλλώματος<br>προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων Από<br>την έναρξη<br>σχηματισμού του 1ου<br>καρπού έως την<br>πλήρη ωρίμανση των<br>καρπών<br>(BBCH 51-89)                             | 3/10 |
| Κολοκύθι (Α)<br>CUUPG                        | Ωίδιο<br><i>Erysiphe<br/>cichoracearum</i><br>ERYSCI<br><i>Sphaerotheca<br/>fuliginea</i><br>SPHRFU<br><br>Κλαδοσπορίωση<br><i>Cladosporium<br/>cucumerinum</i><br>CLADCU | 100 | 100 | 50-150 | Ψεκασμός<br>φυλλώματος<br>προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων. Από<br>την έναρξη<br>σχηματισμού του 1 <sup>ου</sup><br>καρπού έως την<br>πλήρη ωρίμανση των<br>καρπών<br>(BBCH 51-89)                | 3/10 |
| Πεπόνι (Α)<br>CUMME<br>Καρπούζι (Α)<br>CITLA | Ωίδιο<br><i>Erysiphe<br/>cichoracearum</i><br>ERYSCI<br><i>Sphaerotheca<br/>fuliginea</i><br>SPHRFU<br><br>Κλαδοσπορίωση<br><i>Cladosporium<br/>cucumerinum</i><br>CLADCU | 100 | 100 | 50-100 | Ψεκασμός<br>φυλλώματος<br>προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων.<br>Από την εμφάνιση<br>του 1 <sup>ου</sup> πλάγιου<br>βλαστού έως και την<br>πλήρη ωρίμανση των<br>καρπών<br>(BBCH 21-89)             | 3/8  |
| Πεπόνι (Θ)<br>CUMME<br>Καρπούζι (Θ)<br>CITLA | Ωίδιο<br><i>Erysiphe<br/>cichoracearum</i><br>ERYSCI                                                                                                                      | 100 | 100 | 50-100 | Ψεκασμός<br>φυλλώματος<br>προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των                                                                                                                                                                 | 3/8  |

|                        |                                                                                                                                                                                                          |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                  |     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                        | <i>Sphaerotheca fuliginea</i><br>SPHRFU<br><br>Κλαδοσπορίωση<br><i>Cladosporium cucumerinum</i><br>CLADCU                                                                                                |     |     |        | πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 1 <sup>ου</sup> πλάγιου βλαστού έως και την πλήρη ωρίμανση των καρπών (BBCH 21-89)                                                                                      |     |
| Τομάτα (Α)<br>LYPES    | Αλτερνάρια<br><i>Alternaria sp.</i><br>ALTESP<br><br>Ωίδιο<br><i>Leveillula taurica</i><br>LEVETA<br><i>Oidium neolycopersici</i><br>OIDINL<br><br>Κλαδοσπορίωση<br><i>Cladosporium fulvum</i><br>FULVFU | 100 | 100 | 50-100 | Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 1 <sup>ου</sup> πλάγιου βλαστού έως ότου το 70% των καρπών αποκτήσουν το τυπικό τους χρώμα – ωρίμανση (BBCH 20-87) | 3/7 |
| Τομάτα (Θ)<br>LYPES    | Ωίδιο<br><i>Leveillula taurica</i><br>LEVETA<br><i>Oidium neolycopersici</i><br>OIDINL                                                                                                                   | 100 | 100 | 50-100 | Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 1 <sup>ου</sup> πλάγιου βλαστού έως ότου το 70% των καρπών αποκτήσουν το τυπικό τους χρώμα – ωρίμανση (BBCH 20-87) | 3/8 |
| Μελιτζάνα (Α)<br>SOLME | Αλτερνάρια<br><i>Alternaria sp.</i><br>ALTESP<br><br>Ωίδιο<br><i>Leveillula taurica</i><br>LEVETA<br><i>Oidium neolycopersici</i><br>OIDINL                                                              | 100 | 100 | 50-100 | Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 1 <sup>ου</sup> πλάγιου βλαστού έως ότου το 70% των καρπών αποκτήσουν το τυπικό τους χρώμα – ωρίμανση (BBCH 20-87) | 3/7 |
| Μελιτζάνα (Θ)<br>SOLME | Ωίδιο<br><i>Leveillula taurica</i>                                                                                                                                                                       | 100 | 100 | 50-100 | Ψεκασμός φυλλώματος                                                                                                                                                                                              | 3/8 |

|                      |                                                                                                                                             |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                  |      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                      | LEVETA<br><i>Oidium neolycopersici</i><br>OIDINL                                                                                            |     |     |        | προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 1 <sup>ου</sup> πλάγιου βλαστού έως ότου το 70% των καρπών αποκτήσουν το τυπικό τους χρώμα – ωρίμανση (BBCH 20-87)                     |      |
| Πιπεριά (Α)<br>CPSAN | Αλτερνάρια<br><i>Alternaria sp.</i><br>ALTESP<br><br>Ωίδιο<br><i>Leveillula taurica</i><br>LEVETA<br><i>Oidium neolycopersici</i><br>OIDINL | 100 | 100 | 50-100 | Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 1 <sup>ου</sup> πλάγιου βλαστού έως ότου το 70% των καρπών αποκτήσουν το τυπικό τους χρώμα – ωρίμανση (BBCH 20-87) | 2/10 |
| Πιπεριά (Θ)<br>CPSAN | Ωίδιο<br><i>Leveillula taurica</i><br>LEVETA                                                                                                | 100 | 100 | 50-100 | Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την εμφάνιση του 1 <sup>ου</sup> πλάγιου βλαστού έως ότου το 70% των καρπών αποκτήσουν το τυπικό τους χρώμα – ωρίμανση (BBCH 20-87) | 2/10 |
| Πράσο (Α)<br>ALLAM   | Αλτερνάρια<br><i>Alternaria porri</i><br>ALTEPO<br><br>Σκωρίαση<br><i>Puccinia allii</i><br>PUCCAL                                          | 100 | --  | 30-100 | Ψεκασμός φυλλώματος προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από το στάδιο που τα φύλλα πυκνώνουν έως ότου ο μίσχος αποκτήσει την τυπική του διάμετρο και μήκος (BBCH 40-49)                         | 2/14 |

|                              |                                                                                                    |     |    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Κρεμμυδάκι<br>χλωρό<br>ALLCE | Αλτερνάρια<br><i>Alternaria porri</i><br>ALTEPO<br><br>Σκωρίαση<br><i>Puccinia allii</i><br>PUCCAL | 100 | -- | 30-60  | Ψεκασμός<br>φυλλώματος<br>προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων. Από<br>το στάδιο που τα<br>φύλλα πυκνώνουν<br>έως ότου ο βολβός<br>έχει φθάσει στο 50%<br>του τελικού του<br>μεγέθους<br>(BBCH 40-45)                                             | 1    |
| Σκόρδο<br>ALLSA              | Αλτερνάρια<br><i>Alternaria porri</i><br>ALTEPO<br><br>Σκωρίαση<br><i>Puccinia allii</i><br>PUCCAL | 100 | -- | 30-60  | Ψεκασμός<br>φυλλώματος<br>προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων. Από<br>το στάδιο που τα<br>φύλλα πυκνώνουν<br>έως ότου ο βολβός<br>έχει φθάσει στο 50%<br>του τελικού του<br>μεγέθους<br>(BBCH 40-45)                                             | 1    |
| Σπαράγγι<br>ASPSS            | Σκωρίαση<br><i>Puccinia asparagi</i><br>PUCCAS                                                     | 100 | -- | 30-100 | Ψεκασμός<br>φυλλώματος<br>προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων.<br>Όταν σταματήσει να<br>αναπτύσσεται ο<br>μακρύτερος βλαστός<br>έως τη γήρανση του<br>υπέργειου τμήματος<br>(BBCH 41-89)                                                         | 2/14 |
| Μπιζέλι<br>(αρακάς)<br>PIBSX | Ασκοχύτωση<br><i>Ascochyta pisi</i><br>ASCOPI                                                      | 100 | -- | 30-100 | Ψεκασμός<br>φυλλώματος<br>προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων.<br>Από την εμφάνιση<br>των πετάλων (άνθη<br>ακόμη κλειστά) έως<br>ότου το 70% των<br>λοβών έχουν φθάσει<br>το τυπικό τους<br>μέγεθος (εκχέεται<br>χυμός με πίεση)<br>(BBCH 59-77) | 2/14 |

|                                                                                                             |                                                                                                          |     |    |        |                                                                                                                                                                                                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Μαϊντανός (Α)<br>PARCR                                                                                      | Αλτερνάρια<br><i>Alternaria dauci</i><br>ALTEDA<br><br>Σεπτορίωση<br><i>Septoria apiicola</i><br>SEPTAP  | 100 | -- | 30-120 | Ψεκασμοί<br>φυλλώματος.<br>Προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων.<br>Έναρξη ανάπτυξης<br>του φυλλώματος έως<br>ότου φθάσει στο<br>τυπικό του μέγεθος<br>και μορφή<br>(BBCH 40-49) | 2/7 |
| Μαρούλι (Α)<br>LACSA                                                                                        | Αλτερνάρια<br><i>Alternaria brassicae</i><br>ALTEBA<br><br>Κερκόσπορα<br><i>Cercospora sp.</i><br>CERCSP | 100 | -- | 30-120 | Ψεκασμοί<br>φυλλώματος.<br>Προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων.<br>Έναρξη ανάπτυξης<br>του φυλλώματος έως<br>ότου φθάσει στο<br>τυπικό του μέγεθος<br>και μορφή<br>(BBCH 40-49) | 2/7 |
| Φύλλα<br>σέλινου*<br>(Α)<br>APUGS<br>Φύλλα<br>άνηθου*<br>(Α)<br>AFEGR<br><br>Χρήσεις<br>ήσσονος<br>σημασίας | Αλτερνάρια<br><i>Alternaria brassicae</i><br>ALTEBA<br><br>Κερκόσπορα<br><i>Cercospora sp.</i><br>CERCSP | 100 | -- | 30-120 | Ψεκασμοί<br>φυλλώματος.<br>Προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων.<br>Έναρξη ανάπτυξης<br>του φυλλώματος έως<br>ότου φθάσει στο<br>τυπικό του μέγεθος<br>και μορφή<br>(BBCH 40-49) | 2/7 |
| Σκαρόλα (Α)/<br>πλατύφυλλο<br>αντίδι (Α)<br>CICEN<br>Ρόκα (Α)<br>ERUVE                                      | Κερκόσπορα<br><i>Cercospora sp.</i><br>CERCSP                                                            | 100 | -- | 30-120 | Ψεκασμοί<br>φυλλώματος.<br>Προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων.<br>Έναρξη ανάπτυξης<br>του φυλλώματος έως<br>ότου φθάσει στο<br>τυπικό του μέγεθος<br>και μορφή<br>(BBCH 40-49) | 2/7 |
| Σπανάκι (Α)<br>SPQOL                                                                                        | Κερκόσπορα<br><i>Cercospora sp.</i><br>CERCSP<br><br><u>Χρήσεις ήσσονος<br/>σημασίας:</u>                | 100 | -- | 30-120 | Ψεκασμοί<br>φυλλώματος.<br>Προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων.                                                                                                                 | 2/7 |

|                                            |                                                                                                                                                                                 |     |     |        |                                                                                                                                                                                                                              |      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                            | <p>Ανθράκωση**<br/><i>Colletotrichum</i> sp.<br/>COLLSP</p> <p>Περονόσπορος**<br/><i>Peronospora</i> sp.<br/>PEROSP</p> <p>Κλαδοσπόριο**<br/><i>Cladosporium</i><br/>CLADSP</p> |     |     |        | Έναρξη ανάπτυξης του φυλλώματος έως ότου φθάσει στο τυπικό του μέγεθος και μορφή (BBCH 40-49)                                                                                                                                |      |
| Αγκινάρα<br>CYUSC                          | <p>Ωίδιο<br/><i>Erysiphe cichoracearum</i><br/>ERYSCI</p> <p><i>Sphaerotheca fuliginea</i><br/>SPHRFU</p>                                                                       | 100 | --  | 30-100 | Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την πλήρη κάλυψη του εδάφους από τα φύλλα έως την εμφάνιση της ανθοταξίας (κεφαλής) (BBCH 40-55)                                               | 3/10 |
| Φράουλα (Θ)<br>FRAAN                       | Ωίδιο<br><i>Podosphaera</i> sp.<br>PODOSP                                                                                                                                       | 100 | 100 | 50-100 | Ψεκασμοί φυλλώματος. Προληπτικά ή με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. Από την έναρξη σχηματισμού των στολώνων (μήκος > 2εκ) έως τη δεύτερη συγκομιδή που οι περισσότεροι καρποί έχουν λάβει το τυπικό χρώμα (BBCH 40-89) | 2/7  |
| Ηλιάνθος<br>HELAN                          | <i>Diaporthe helianthi</i><br>DIAPHE                                                                                                                                            | 100 |     | 20-60  | Από την εμφάνιση των ταξιανθιών μέχρι το διαχωρισμό τους από τα νεαρά φύλλα (BBCH 51-55)                                                                                                                                     | 1    |
| Ελιά<br>(βρώσιμη & ελαιοποιήσιμη)<br>OLVEU | <p>Κυκλοκόνιο<br/><i>Spilocaea oleaginea</i><br/>CYCLOL</p> <p><u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u><br/>Κερκόσπορα*<br/><i>Pseudocercospora cladosporioides</i><br/>CERCCL</p>        | 100 | 100 | 50-100 | Από την έναρξη ανάπτυξης των νέων φύλλων έως πριν την άνθηση (BBCH 11-59)                                                                                                                                                    | 1    |

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |     |        |                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Φακή*<br>LENCU<br>Ρεβίθι *<br>CIEAR<br><br>καλλιέργειες<br>ήσσονος<br>σημασίας | Ασκοχύτωση<br><i>Ascochyta pisi</i><br>ASCOP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100   | --  | 30-100 | Ψεκασμός<br>φυλλώματος<br>προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων.<br>Από την εμφάνιση<br>των πετάλων (άνθη<br>ακόμη κλειστά) έως<br>το τέλος της άνθησης<br>(BBCH 59-67)                                                            | 2/14 |
| Μπάμια* (A)<br>ABMES<br><br>καλλιέργεια<br>ήσσονος<br>σημασίας                 | Αλτερνάρια<br><i>Alternaria sp.</i><br>ALTESP<br><br>Ωίδιο<br><i>Leveillula taurica</i><br>LEVETA<br><i>Oidium</i><br><i>neolycopersici</i><br>OIDINL                                                                                                                                                                                                                 | 100   | 100 | 50-100 | Ψεκασμός<br>φυλλώματος<br>προληπτικά ή με την<br>εμφάνιση των<br>πρώτων<br>συμπτωμάτων.<br>Από την εμφάνιση<br>του 1 <sup>ου</sup> πλάγιου<br>βλαστού έως ότου το<br>70% των καρπών<br>αποκτήσουν το<br>τυπικό τους μέγεθος<br>– ωρίμανση<br>(BBCH 20-87) | 2/10 |
| Φιστικιά*<br>PIAVE<br><br>Χρήση ήσσονος<br>σημασίας                            | Ωίδιο<br><i>Phyllactinia guttata</i><br>PHYLGU<br><br><i>Microsphaera</i><br><i>alphitoides</i><br>MCRSAL<br><br>Σκωρίαση<br><i>Tranzschelia pruni-</i><br><i>spinosae</i><br>TRANPS<br><br>Βοτρυοσφαίρια<br><i>Botryosphaeria</i><br><i>dothidea</i><br>BOTSDO<br><br>Σεπτορίωση<br><i>Mycosphaerella</i><br><i>pistacina</i><br><i>Septoria pistacina</i><br>MYCOPT | 50-75 | --  | 50-100 | Ψεκασμός<br>φυλλώματος με την<br>εμφάνιση των<br>προσβολών από το<br>στάδιο της εμφάνισης<br>των πράσινων<br>κορυφών έως και<br>τα πρώτα πέταλα των<br>ανθέων να είναι<br>ορατά<br>(BBCH 11-59)                                                           | 1    |
| Αμυγδαλιά*<br>PRNDU<br><br>Χρήση<br>ήσσονος<br>σημασίας                        | Μονίλια<br><i>Monilia sp.</i><br>MONISP<br><br>Πολυστίγμωση<br><i>Polystigma fulvum</i>                                                                                                                                                                                                                                                                               | 50-75 | --  | 50-100 | Ψεκασμός<br>φυλλώματος με την<br>εμφάνιση των<br>προσβολών από το<br>στάδιο της<br>εμφάνισης                                                                                                                                                              | 1    |

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |              |    |               |                                                                                                                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                           | <b>POLTFU</b><br><br><b>Κορύνεο</b><br><i>Coryneum</i><br><i>beijerinckii</i><br><i>Wilsonomyces</i><br><i>carpophilus</i><br><b>STIGCA</b><br><br><b>Φώμοψη</b><br><i>Fusicoccum</i><br><i>amygdale</i><br><b>FUSCAM</b> |              |    |               | των πράσινων κορυφών έως και τα πρώτα πέταλα των ανθέων να είναι ορατά (BBCH 11-59)                                                                               |          |
| <b>Καστανιά*</b><br><b>CSNSA</b><br><br><b>Χρήση</b><br><b>ήσσονος</b><br><b>σημασίας</b> | <b>Φαιά σήψη</b><br><i>Gnomoniopsis</i><br><i>smithogilvyi</i><br><b>GNMPCA</b>                                                                                                                                           | <b>50-75</b> | -- | <b>50-100</b> | Ψεκάσμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της εμφάνισης των πράσινων κορυφών έως και τα πρώτα πέταλα των ανθέων να είναι ορατά (BBCH 11-59) | <b>1</b> |
| <b>Καρυδιά*</b><br><b>IUGRE</b><br><br><b>Χρήση</b><br><b>ήσσονος</b><br><b>σημασίας</b>  | <b>Ανθράκωση</b><br><i>Gnomonia</i><br><i>leptostyla</i><br><b>GNOMLE</b>                                                                                                                                                 | <b>50-75</b> | -- | <b>50-100</b> | Ψεκάσμός φυλλώματος με την εμφάνιση των προσβολών από το στάδιο της εμφάνισης των πράσινων κορυφών έως και τα πρώτα πέταλα των ανθέων να είναι ορατά (BBCH 11-59) | <b>1</b> |

Παρατηρήσεις:

\* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της φακής, του ρεβιθιού, της μπάμιας, των φύλλων σέλινου, των φύλλων άνηθου, της φιστικιάς, της αμυγδαλιάς, της καστανιάς και της καρυδιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.

\*\* Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά της ανθράκωσης, του περονόσπορου και του κλαδοσπόριου στην καλλιέργεια του σπανακιού και κατά της κερκόσπορας στην καλλιέργεια της ελιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του.

**P405+P102:** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

**P201:** Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

**P202:** Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

**P261:** Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα.

**P264:** Πλύνετε τα μολυσμένα μέρη του σώματος, σχολαστικά μετά το χειρισμό.

**P270:** Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

**P280:** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

*Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή. Επιπλέον να φοράτε και μέσα προστασίας ματιών/προσώπου και μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής κατά την ανάμιξη/φόρτωση.*

*Σε περίπτωση επανεισόδου στην ψεκασμένη περιοχή μετά την εφαρμογή φοράτε γάντια, μακρυμάνικο πουκάμισο και μακρύ παντελόνι.*

**P501:** Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

**SP1:** ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ Η ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ.

[Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους].

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης 10-12 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες του σκόρδου, του φρέσκου κρεμμυδιού, του καρότου, του παστινακίου, του μπιζελιού, του ρεβιθιού, της φακής και της φράουλας.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη φυτική ζώνη ανάσχεσης 18-20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τις καλλιέργειες των σολανωδών, των κολοκυνθοειδών, των κραμβοειδών, της αγκινάρας, του σπαραγγιού, του πράσου, του σέλερου, του φινόκιο (μαραθόριζα), του μαϊντανού, του μαρουλιού, της σκαρόλας /πλατύφυλλου αντιδιού, του σπανακιού, της ρόκας, της μπάμιας, των φύλλων σέλινου και των φύλλων άνηθου.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή να χρησιμοποιήσετε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% για την καλλιέργεια του ηλίανθου.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 20 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα ή να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% για τις καλλιέργειες της ελιάς, της φιστικιάς, της **αμυγδαλιάς, της καστανιάς και της καρυδιάς.**

**13 Προστασία των καταναλωτών**

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

| Καλλιέργεια                                                                                                                                                                                                                  | Ημέρες |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Τομάτα (Α), Μελιτζάνα (Α), Αγκινάρα, Φρέσκο κρεμμυδάκι                                                                                                                                                                       | 7      |
| Τομάτα (Θ), Μελιτζάνα (Θ), Πιπεριά (Α/Θ), Αγγούρι (Α), Κολοκύθι (Α), Πεπόνι (Α/Θ), Καρπούζι (Α/Θ), Φράουλα (Θ), Μπάμια (Α)                                                                                                   | 3      |
| Σπαράγγι, Ηλίανθος, Ελιά                                                                                                                                                                                                     | --     |
| Καρότο, Παστινάκι, Κουνουπίδι, Μπρόκολο, Μαϊντανός (Α), Σκόρδο, Σέλερυ, Φινόκιο (Μαραθόριζα), Αρακάς, Φακή, Ρεβίθι, Μαρούλι (Α), Σκαρόλα / πλατύφυλλο αντίδι (Α), Σπανάκι (Α), Ρόκα (Α), Φύλλα σέλινου (Α), Φύλλα άνηθου (Α) | 14     |
| Λάχανο, Πράσο                                                                                                                                                                                                                | 21     |
| Ρύζι, Φιστικιά, <b>Αμυγδαλιά, Καστανιά, Καρυδιά</b>                                                                                                                                                                          | 28     |

**II. Διάθεση αποθεμάτων**

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

**III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 5702/77151/26.09.2018 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.**

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**