



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.07.2026
Αριθ. πρωτ.: 191229

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λ. Συγγρού 348, 176 74, Καλλιθέα

e-mail: kornilia.mitsopoulou@fmc.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. 14883 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) EXIREL 10 SE (δ.ο. cyantraniliprole 10% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος και την προστασία των καταναλωτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 37,4 και 45 αυτού.
 - (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - (ΕΕ) με αριθμ. 2026/1123 της 26ης Μαΐου 2026 σχετικά με τον καθορισμό απαιτήσεων επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 547/2011.
 - (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 - (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
- Τη με αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
- Την αριθμ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309)

και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθμ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»

- 5. Την αριθμ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
- 6. Την αριθμ. 4901/123404/10.10.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14883 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) EXIREL 10 SE (cyantraniliprole 10% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- 7. Την από τον Μάιο του 2026 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Μάλτας για το προϊόν EXIREL 10 SE (κωδ. προϊόντος: Cyantraniliprole 100 g/L SE).
- 8. Την αριθμ. 107591/25.04.2025 αίτηση που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε την αριθμ. **14883** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(εντομοκτόνο) EXIREL 10 SE (δ.ο. cyantraniliprole 10% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθμ. 4901/123404/10.10.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία **5**, **11** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρ.	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Εσπεριδοειδή Πορτοκαλιά CIDSΙ Μανταρινιά CIDRE Γκρέιπφρουτ CIDPA	Λεπιδόπτερα <i>Prays citri</i> PRAYC	25-50	-	30-200	Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών. Από την έκπτυξη των βλαστών έως πριν την διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών (BBCH 31-50)	1 ανά τρία χρόνια
Λεμονιά CIDLI Πράσινα λεμόνια (lime) CIDAΦ	Λεπιδόπτερα <i>Phyllocnistis citrella</i> PHYNC	40-74	-	30-185	Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης από την έκπτυξη των βλαστών έως πριν την διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών. (BBCH 31-50)	
	Αφίδες <i>Aphis spiraecola</i> APHISI <i>Aphis gossypii</i> APHIGO	74	-	74-99	Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης από το στάδιο όπου είναι ορατές οι κορυφές των φύλλων στους οφθαλμούς έως την πλήρη ανάπτυξη των βλαστών (BBCH 09-39)	

	Θρίπες <i>Pezothrips kellyanus</i> PEZTKE <u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Αλευρώδης** <i>Parabemisia myricae</i> PRABMY Ψύλλα των εσπεριδοειδών** <i>Trioza erytreae</i> TRIZER Μαύρος ακανθώδης αλευρώδης** <i>Aleurocanthus spiniferus</i> ALECSN	74	-	74-99	Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης από την διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών έως την καρπόδεση (BBCH 51-71)	
	Δίπτερα <i>Ceratitis capitata</i> CERTCA	74	-	74-99	Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης από την καρπόδεση (οι καρποί έχουν αποκτήσει το 40% του μεγέθους) έως και την έναρξη του χρωματισμού των καρπών (BBCH 74-82)	
	Αλευρώδεις <i>Aleurothrixus floccosus</i> ALTHFL <i>Dialeurodes citri</i> DIALCI	74	-	74-200	Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης από την διόγκωση των ανθοφόρων οφθαλμών έως και την καρπόδεση (BBCH 51-72)	
Ελιά OLVEU	Λεπιδόπτερα <i>Prays oleae</i> PRAYOL	20-35	-	70-175	Ψεκασμός φυλλώματος υψηλής πίεσης στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών. Από το στάδιο όπου οι ανθοφόροι οφθαλμοί είναι ακόμα κλειστοί έως την έναρξη της ωρίμανσης (BBCH 50-81)	2 ανά τρία χρόνια (με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7 ημέρες)

Αμπέλι οινοποιήσιμο VITVI	Λεπιδόπτερα <i>Lobesia botrana</i> POLYBO	34	-	57-68	Ψεκασμός στην ζώνη των τσαμπιών στα αρχικά στάδια προσβολής κατά την εκκόλαψη των αυγών και την εμφάνιση των προνυμφών. Από την καρπόδεση (οι νεαροί καρποί αρχίζουν να διογκώνονται, τα υπολείμματα των λουλουδιών χάνονται) μέχρι το μαλάκωμα των ρωγών (BBCH 71-85)	1 ανά τρία χρόνια
Κερασιά* PRNAV Χρήση ήσσονος σημασίας	Δροσόφιλα <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU Ραγολέτιδα <i>Rhagoletis cerasi</i> RHAGCE	-	74	74-99	Από το στάδιο όπου ο καρπός έχει αποκτήσει το 90% του μεγέθους του έως την ωρίμαση των καρπών. (BBCH 79-87)	1 ανά τρία χρόνια
Ροδακινιά PRNSS	<u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Δροσόφιλα* <i>Drosophila suzukii</i> DROSSU	-	74	74-99	Από το τέλος της άνθησης έως την ωρίμαση των καρπών. (BBCH 69-87)	1 ανά τρία χρόνια
Αραβόσιτος ZEAMX (και για ενσίρωση)	Οστρίνια <i>Ostrinia nubilalis</i> PYRUNU Σεσάμια <i>Sesamia sp.</i> SESASP	40 ή 50		30-80	Μία εφαρμογή: Από το πρώιμο στάδιο εκκίνησης (το περίβλημα των φύλλων της σημαίας επεκτείνεται) έως το τέλος της κεφαλής (ταξιανθία πλήρως ανεπτυγμένη) BBCH 40-59 ή Από την υδαρή ωρίμανση (οι πρώτοι κόκκοι έχουν φτάσει στο μισό του τελικού τους μεγέθους) έως την αρχή της ωρίμανσης BBCH 71-83	1 ανά τρία χρόνια (δόση 40 κ. εκ./στρ.) ή 1 ανά τέσσερα χρόνια (δόση 50 κ. εκ./στρ.)

Παρατηρήσεις:

1. Μην εφαρμόζετε όταν οι καλλιέργειες βρίσκονται υπό καταπόνηση.
2. Η χρήση στο γκρέιπφρουτ περιλαμβάνει και τη φράπα.
3. Η χρήση στη πορτοκαλιά περιλαμβάνει και το περγαμόντο, τη νεραντζιά και το σαγκουίνι.
4. Η χρήση στη λεμονιά περιλαμβάνει και το κιτρολέμονο.
5. Η χρήση στη μανταρινιά περιλαμβάνει και τις κλημεντίνες, τη σατσούμα και τις ταγγερίνες.
6. Για τον αραβόσιτο: Η συνολική δόση ανά τέσσερα χρόνια ή η μέγιστη δόση να είναι 50 κ. εκ./στρ.

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της ροδακινιάς και της κερασιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

****Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα κατά του αλευρώδη, της ψύλλας των εσπεριδοειδών και του μαύρου ακανθώδη αλευρώδη στις καλλιέργειες των εσπεριδοειδών. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.**

11 Δηλώσεις προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/ εκνεφώματα.

P264: Πλένετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη / φόρτωση και κατά την εφαρμογή.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά την εφαρμογή φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια».

«Στα εσπεριδοειδή με πυκνή φύτευση, δεν επιτρέπεται η χρήση ψεκαστικών μέσων χειρός και επινώτιου ψεκαστήρα, για να αποφευχθεί η επαφή των χειριστών με τη ψεκαζόμενη καλλιέργεια».

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

SPE2: Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, το προϊόν να εφαρμόζεται κάθε τρία χρόνια για τα εσπεριδοειδή, την ελιά, το αμπέλι, την κερασιά και τη ροδακινιά.

SPE2: Για να προστατέψετε τα υπόγεια ύδατα, εφαρμόστε το προϊόν αυτό ή οποιοδήποτε άλλο, το οποίο περιέχει τη δραστική ουσία cyantraniliprole, κάθε τρία έτη στον ίδιο αγρό για τη δόση 40 κ.εκ/στρ. για τον αραβόσιτο ή κάθε τέσσερα έτη στον ίδιο αγρό για τη δόση 50 κ.εκ/στρ. για τον αραβόσιτο.

SPE3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, να αφήσετε μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα για τα εσπεριδοειδή, την ελιά, την κερασιά, τη ροδακινιά **και για τη δόση 50 κ.εκ/ στρ. για τον αραβόσιτο.**

SPE3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους να αφήσετε μία απέκαστη ζώνη προστασίας:

- 5 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 95% ή 10 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% για τα εσπεριδοειδή, την κερασιά και τη ροδακινιά.
- 5 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 95% για την ελιά.
- 10 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50% ή 5 μέτρων από μη γεωργική γη με ταυτόχρονη χρήση ακροφύσιων μείωσης της διασποράς του

ψεκαστικού υγρού κατά 75% ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 90% για την καλλιέργεια του αμπελιού.

- 5 μέτρων από μη γεωργική γη ή χρησιμοποιήστε ακροφύσια μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού υγρού κατά 50% για τη δόση 50 κ.εκ/ στρ. για τον αραβόσιτο.

Spre8: Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε ή/και καταστρέψτε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους.

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια	Ημέρες
Πορτοκαλιά (0110020), Μανταρινιά (0110050), Γκρέιπφρουτ (0110010), Λεμονιά (0110030), Πράσινα λεμόνια-lime (0110040), Φράπα (0110010-002), Περγαμόντο (0110020-001), Νεραντζιά (0110020-002), Σαγκουίνι (0110020-003), Κιτρολέμονο (0110030-002), Κλημεντίνες (0110050-002), Σατσούμα (0110050-005), Ταγγερίνες (0110050-006), Κερασιά (0140020), Ροδακινιά (0140030)	7
Ελιά (0161030, 0402010)	14
Αμπέλι (οινοποιήσιμο) (0151020)	10
Αραβόσιτος (0500030)	21

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 4901/123404/10.10.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ α. α.

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ