



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 10.09.2026
Αριθ. πρωτ.: 232937

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Ανθούσας, 15349, Ανθούσα Αττικής

syngenta-hellas.regulatory@syngenta.com

ΘΕΜΑ: «Διεύρυνση της με αριθ. 61187 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORONDIS EVO 25/1.2 SC (azoxystrobin 25% β/ο + oxathiapiprolin 1,2 β/ο) σε ήσσονος σημασίας χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α'45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - Του ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
- Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 51 αυτού.
- Την αριθμ. 10088/115732/26.09.2013 Υπουργική απόφαση (Β'2587) σχετικά με τη «Διαδικασία καθορισμού χρήσεων ήσσονος σημασίας και αξιολόγηση αιτήσεων για επέκταση αδειών διάθεσης στην αγορά σε χρήσεις ήσσονος σημασίας».
- Την αριθμ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'2339/14.05.25).
- Το αριθμ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθμ. 389920/09.12.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 61187 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORONDIS EVO 25/1.2 SC (azoxystrobin 25% β/ο + oxathiapiprolin 1,2 β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
- Την αριθμ. 147652/09.06.2026 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Διευρύνουμε τη με αριθ. 61187 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) ORONDIS EVO 25/1.2 SC (azoxystrobin 25% β/ο + oxathiapiprolin 1,2 β/ο), που

χορηγήθηκε με την αριθμ. 389920/09.12.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε ήσσονος σημασίας χρήσεις.

Τα σημεία **5** και **13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
		κ.εκ./ στρ.	κ.εκ./ 10.000 τμ LWA (max)**	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Τομάτα (Θ) LYPES	Περονόσπορος <i>Phytophthora infestans</i> PHYTIN Ωίδιο <i>Oidium neolycopersici</i> OIDIN <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	100	500	20-100	Προληπτικός ψεκασμός φυλλώματος. - Σε μη αποστραγγιζόμενα εδάφη από την έκπτυξη του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως τη συγκομιδή BBCH 11-89. - Σε αποστραγγιζόμενα εδάφη από την έκπτυξη του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την ωρίμανση του 10% των καρπών BBCH 11-81	2/7
Αγγούρι (Θ) CUMSA Κολοκύθι (Θ) CUUPG Πεπόνι (Θ) CUMME Καρπούζι (Θ) CITLA	Περονόσπορος <i>Pseudoperonospora cubensis</i> PSPECU Μαύρη σήψη <i>Didymella bryoniae</i> DIDYBR	100	500	20-100	Προληπτικός ψεκασμός φυλλώματος. - Σε μη αποστραγγιζόμενα εδάφη από την έκπτυξη του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως τη συγκομιδή BBCH 11-89. - Σε αποστραγγιζόμενα εδάφη από την έκπτυξη του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως την ωρίμανση του 10% των καρπών BBCH 11-81	2/7
Μαρούλι (Θ) LACSA <u>Χρήση ήσσονος σημασίας:</u> Σκαρόλα/ Πλατύφυλλο αντίδι* (Θ) CICEN	Περονόσπορος <i>Bremia</i> sp. BREMSP Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	100	--	20-80	Προληπτικός ψεκασμός φυλλώματος. - Σε μη αποστραγγιζόμενα εδάφη από την έκπτυξη του 1 ^{ου} πραγματικού φύλλου έως το φυτό αποκτήσει το τυπικό του μέγεθος και μορφή BBCH 11-49 - Σε αποστραγγιζόμενα εδάφη από την εμφάνιση των κοτυληδόνων έως την έκπτυξη του 3 ^{ου} πραγματικού φύλλου BBCH 09-13	2/7 1

Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανομένων ειδών κράμβης)* (Θ)	Περωνόσπορος <i>Bremia</i> sp. BREMSP Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	100	--	30-120	Προληπτικός ψεκασμός φυλλώματος. - Σε μη αποστραγγιζόμενα εδάφη από το 1 ^ο έως το 8 ^ο πραγματικό φύλλο BBCH 11-18 - Σε αποστραγγιζόμενα εδάφη από την εμφάνιση των κοτυληδόνων έως την έκπτυξη του 3 ^{ου} πραγματικού φύλλου BBCH 09-13	2/7 1
---	--	-----	----	--------	--	----------------------------------

Παρατηρήσεις:

- Η χρήση στο Μαρούλι περιλαμβάνει τα Κατσαρά Μαρούλια, Μαρούλια Σαλάτες, Κεφαλωτά Μαρούλια και Κοινά Μαρούλια.
- Η χρήση στην τομάτα περιλαμβάνει τα τοματίνια (PHYGR).
- Σε γραμμικά συστήματα φύτευσης/ καλλιέργειες κάθετης ανάπτυξης, για την εφαρμογή της βέλτιστης δόσης σε σχέση με το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας, να γίνεται υπολογισμός της δόσης ανά στρέμμα λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις της καλλιέργειας (ύψος βλάστησης και απόσταση μεταξύ των γραμμών) και τη δόση LWA ως εξής:

***Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες σκαρόλας/πλατύφυλλου αντιδιού και των καλλιεργειών νεαρών φύλλων από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.**

**Δόση LWA :

Τελική εφαρμοζόμενη δόση ανά στρέμμα= (LWA/100.000) x Δόση LWA (από τον ανωτέρω πίνακα),

όπου LWA= 2 x (ύψος βλάστησης (μέτρα) x 10.000/ απόσταση μεταξύ των γραμμών (μέτρα))

Για λαχανοκομικές καλλιέργειες θερμοκηπίου:

Ως ύψος βλάστησης ορίζεται η απόσταση από το σταύρωμα μέχρι την κορυφή της βλάστησης.

Η Δόση LWA είναι σταθερή (500 κ.εκ. ανά 10.000 τ.μ. LWA), ενώ η τελική εφαρμοζόμενη δόση ανά στρέμμα αυξάνεται ακολουθώντας το μέγεθος της φυλλικής επιφάνειας, με μέγιστη επιτρεπτή δόση αυτή των 100 κ.εκ. ανά στρέμμα.

Ενδεικτικά, παρατίθεται ο παρακάτω πίνακας υπολογισμού τελικών εφαρμοζόμενων δόσεων ανά στρέμμα:

		Υψος βλάστησης (μέτρα)							
Απόσταση μεταξύ των γραμμών (μέτρα)		0,25	0,5	0,75	1	1,25	1,5	1,75	2
	0,75	33	67	100	100	100	100	100	100
	1	25	50	75	100	100	100	100	100
	1,25	20	40	60	80	100	100	100	100
	1,5	17	33	50	67	83	100	100	100
	2	13	25	38	50	63	75	88	100

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Τομάτα (Θ) (0231010), Τοματίνια (Θ) (0231010-004), Αγγούρι (Θ) (0232010), Πεπόνι (Θ) (0233010), Καρπούζι (Θ) (0233030), Κολοκύθι (Θ) (0232030)	3
Μαρούλι (Θ) (0251020), Κατσαρά Μαρούλια (Θ) (0251020-001), Μαρούλια Σαλάτες (Θ) (0251020-002), Κεφαλωτά Μαρούλια (Θ) (0251020-003), Κοινά Μαρούλια (Θ) (0251020-004) Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (Θ) (0251080) Σκαρόλα/Πλατύφυλλο αντίδι (Θ) (0251030)	14

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 389920/09.12.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ