



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 13.07.2026
Αριθ. πρωτ.: 183839

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188

Προς: ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ
Θέση Ντράσεζα, (ΒΙ.ΠΑ.)
Αυλώνας Αττικής, Τ.Κ. 190 11

e-mail: ktsarna@minagric.gr

e-mail: agro@elton-group.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 11111 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών) FytoSave (COS-OGA 1,25% β/ο) ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις επικινδυνότητας καθώς και τις δηλώσεις προφύλαξης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 40 και 45 αυτού.
- Την αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
- Την αριθ. 7807/207777/30.08.2021 Απόφαση Υπουργού «Εθνικές απαιτήσεις στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 (L 309) και των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 283/2013 και 284/2013 της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2013 (L 93), σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά της χώρας.»
- Την αριθ. 5163/145140/30.05.2022 εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας με θέμα «Χορήγηση κατάλογου των εκθέσεων δοκιμών και μελετών ενός φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ΦΠΠ).»
- Την από τον Φεβρουαρίου του 2024 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Γαλλίας για το προϊόν FYTOSAVE (κωδ. προϊόντος Fyto11).
- Την αριθ. 1133/18277/30.01.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η αριθ. 11111 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών) FytoSave (COS-OGA 1,25% β/ο), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

8. Την αριθ. 80525/31.03.2026 αίτηση που κατέθεσε η ενδιαφερόμενη εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Ι. Τροποποιούμε την αριθ. **11111** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος **(ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών) FytoSave (COS-OGA 1,25% β/ο)**, που χορηγήθηκε με την αριθ. 1133/18277/30.01.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατηγορία και τον τρόπο δράσης, το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις επικινδυνότητας καθώς και τις δηλώσεις προφύλαξης.

Τα σημεία **4, 5, 10 και 11** διαμορφώνονται ως εξής:

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Το φυτοπροστατευτικό προϊόν FytoSave® δρα ως ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών. Δρα ενισχύοντας την αντίσταση του φυτού ενάντια σε Ωΐδιο, Περονόσπορο, Πυρικούλάρια και **Βακτηριώσεις** μειώνοντας έτσι τις βλαβερές επιπτώσεις τους στις καλλιέργειες.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ		
Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό: Κολοκυθάκι (Θ) CUUPE Αγγούρι (Θ) CUMSA Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό: Πεπόνι (Θ) CUMME Κολοκύθα (Θ) CUUMA	Ωΐδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU	250	330	75	Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη του 3 ^{ου} φύλλου έως τον 3ο καρπό με τυπικό μέγεθος και μορφή. (BBCH 13-73)	5/7
Σολανώδη: Τομάτα (Θ) LYPES Πιπεριά (Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Θ) SOLME Πεπίνι (Θ) SOLMU	Ωΐδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA	250	330	75	Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη του 3 ^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 13-89)	5/7
Σολανώδη: Τομάτα (Υ) LYPES Πιπεριά (Υ) CPSAN Μελιτζάνα (Υ) SOLME Πεπίνι (Υ) SOLMU	Βακτηριώσεις 1BACTK	200	200-267	75-100	Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη του 3 ^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 13-89)	8/7

Σολανώδη: Τομάτα (Θ) LYPES Πιπεριά (Θ) CPSAN Μελιτζάνα (Θ) SOLME Πεπίνιο (Θ) SOLMU	Βακτηριώσεις 1BACTK	200 σε χαμηλές καλλιέργειες (< 50 εκ.) 400 σε ψηλές καλλιέργειες (> 50 κ.εκ.)	200-267 400-533	75-100	Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη του 3 ^{ου} φύλλου έως την πλήρη ωρίμανση των καρπών. (BBCH 13-89)	8/7
Αμπέλι (επιτραπέζιες ποικιλίες και οινοποιήσιμες ποικιλίες) VITVI	Ωίδιο <i>Uncinula necator</i> UNCINE Περονόσπορος <i>Plasmopara viticola</i> PLASVI	200	200-500	40-100	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση των ασθενειών. (BBCH 12-89)	8/8-10
Σπανάκι (Υ+Θ)* SPQOL Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Περονόσπορος <i>Peronospora farinosa</i> f. sp. <i>spinaciae</i> PEROFS Ωίδιο <i>Sphaerotheca fuliginea</i> SPHRFU <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI	200	400-1000	20-50	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση των ασθενειών. (BBCH 13-89)	5/7
Άνηθος (Υ+Θ)* AFEGR Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ωίδιο <i>Erysiphe heraclei</i> ERYSHE	200	400-1000	20-50	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση των ασθενειών. (BBCH 13-89)	5/7
Αγκινάρα (Υ)* CYUSC Χρήση Ήσσοнос Σημασίας	Ωίδιο <i>Leveillula taurica</i> LEVETA <i>Erysiphe cichoracearum</i> ERYSCI <i>Oidium cyclaminis</i> OIDICY	200	260-1000	20-75	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση των ασθενειών. (BBCH 13-89)	5/7
Καλλιέργειες νεαρών φύλλων (συμπεριλαμβανο μένων ειδών κράμβης) (Υ+Θ)	Περονόσπορος <i>Bremia</i> sp. BREMSP <i>Hyaloperonospora parasitica</i> PEROPA <i>Hyaloperonospora brassicae</i> HPERBR <i>Peronospora farinosa</i> PEROFA	250-300	500-1000	30-50	Προληπτικές εφαρμογές από το στάδιο των πλήρως ξεδιπλωμένων κοτυληδόνων έως τη συγκομιδή στο 8 ^ο -9 ^ο φύλλο. (BBCH 10-18)	4/7

Φράουλα (Θ) FRAAN	Ωίδιο <i>Sphaerotheca macularis</i> SPHRMA	250-300	250-750	40-100	Προληπτικές εφαρμογές από την έκπτυξη του 3 ^{ου} φύλλου έως τη συγκομιδή. (BBCH 13-87)	8/7-10
Ρύζι ORYSA	Πυρικούλάρια <i>Pyricularia oryzae</i> PYRIOR	250	-	30-50	Προληπτικές εφαρμογές στην αρχή του σχηματισμού της φόβης έως την πλήρη άνθηση. (BBCH 30-65)	4/10
Κρεμμύδι ALLCE	<u>Χρήση Ήσσονος Σημασίας:</u> Βοτρύτης* <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI	200	500-1000	20-40	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση της ασθένειας από την εμφάνιση του 2 ^{ου} φύλλου και μέχρι ο βολβός να αποκτήσει το 50% του αναμενόμενου μεγέθους. (BBCH 12-45)	5/7
Βερυκοκιά PRNAR	<u>Χρήση Ήσσονος Σημασίας:</u> Κλαδοσπόριο* <i>Venturia carpophila</i> VENTCA	400	400-1000	40-100	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση της ασθένειας από την έναρξη εμφάνισης των φύλλων μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για κατανάλωση. (BBCH 13-89)	8/7
Ακτινίδιο* ATIDE <i>Χρήση Ήσσονος Σημασίας</i>	Βοτρύτης <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Βακτηριακό έλκος <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>) PSDMAK	500	500-1250	40-100	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση της ασθένειας από την έναρξη εμφάνισης των φύλλων μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για κατανάλωση. (BBCH 13-89)	8/7
Ελιά OLVEU	<u>Χρήσεις Ήσσονος Σημασίας:</u> Γλοιοσπόριο* <i>Colletotrichum gloeosporioides</i> COLLGL <i>Colletotrichum acutatum</i>	400	400-1000	40-100	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση της ασθένειας από την έναρξη εμφάνισης των φύλλων μέχρι οι καρποί να είναι	8/7

	COLLAC <i>Colletotrichum clavatum</i> COLLC				ώριμοι για συγκομιδή. (BBCH 13-89)	
Φιστικιά* PIAVE Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Καμαροσπόριο <i>Fusicoccum</i> sp. FUSCSP <i>Botryosphaeria dothidea</i> BOTSDO Σεπτόρια <i>Septoria pistaciarum</i> <i>Septoria pistacina</i> SEPTPZ	400	400-1000	40-100	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση της ασθένειας από την έναρξη εμφάνισης των φύλλων μέχρι την ωρίμαση των καρπών. (BBCH 13-89)	8/7
Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO	<u>Χρήση Ήσσονος</u> <u>Σημασίας:</u> Αλτερνάρια* <i>Alternaria alternata</i> ALTEAL	400	400-1000	40-100	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση της ασθένειας από την έναρξη εμφάνισης των φύλλων μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για κατανάλωση. (BBCH 13-89)	8/7
Μαϊντανός (Υ)* PARCR Χρήση Ήσσονος Σημασίας	Ωίδιο <i>Erysiphe heraclei</i> ERYSHE Σεπτόρια <i>Septoria petroselini</i> SEPTPE Τεφρά σήψη <i>Botrytis cinerea</i> BOTRCI Σηψιρριζία <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> SCLESC Περονόσπορος <i>Plasmopara petroselini</i> PLASPE Κερκόσπορα <i>Cercospora petroselini</i> CERCPE Αλτερναρίωση <i>Alternaria</i> sp. ALTESP	200	400-1000	20-50	Πρώτη εφαρμογή πριν την εμφάνιση των ασθενειών. (BBCH 13-89)	5/7

Παρατηρήσεις:

1. Το Fytosave εφαρμόζεται προληπτικά σε συνδυασμό ή / και σε εναλλαγή με κατάλληλα μυκητοκτόνα ανάλογα με την πίεση των ασθενειών.
2. Για τη βέλτιστη ενεργοποίηση της άμυνας των φυτών, συνιστώνται 2-4 διαδοχικές εφαρμογές στο αμπέλι και 2-3 εφαρμογές στα κηπευτικά, στις καλλιέργειες νεαρών φύλλων, στη φράουλα και στο ρύζι πριν την εμφάνιση των ασθενειών.
3. Σε περίπτωση προσβολής ή όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των παθογόνων και αναμένονται ισχυρές προσβολές, ψεκάστε με κατάλληλο διασυστηματικό μυκητοκτόνο πριν την εφαρμογή του Fytosave. Επίσης, στο αμπέλι συνιστάται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με εγκεκριμένα μυκητοκτόνα κατά του Περονόσπορου ή / και του Ωιδίου. Σε αυτή την περίπτωση η δόση του μυκητοκτόνου προσαρμόζεται σε συνάρτηση με την πίεση της ασθένειας και το φαινολογικό στάδιο του αμπελιού, στα πλαίσια της έγκρισης του μυκητοκτόνου.
4. **Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος κατά των βακτηριώσεων στα σολανώδη είναι μέτρια και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.**
5. **Στα σολανώδη, οι 8 εφαρμογές κατά των βακτηριώσεων προσμετρώνται επιπλέον των εφαρμογών κατά του ωιδίου, με τον μέγιστο συνολικό αριθμό εφαρμογών να διαμορφώνεται στις 13 ανά καλλιεργητική περίοδο**

* «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα στις χρήσεις ή σσονος σημασίας και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος. Ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

10 Δηλώσεις
επικινδυνότητας:

ΕΥΗ 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις
προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.

P270: Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P501: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SPe2: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών, μην απορρίπτετε λύματα θερμοκηπίων υδροπονίας απευθείας στα επιφανειακά ύδατα.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).

SPe8: Πιθανώς επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα έντομα-επικονιαστές να μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας ζιζανίων. Απομακρύνετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν.

Μπορεί να επηρεάσει τους επικονιαστές. Αποφύγετε την περιττή έκθεση.

- II. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 1133/18277/30.01.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ