



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 09.07.2026
Αριθ. πρωτ.: 181265

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: SIPCAM OXON S.p.A., Ιταλίας
δια του υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. Α.Ε.
e-mail: info@sipcam.gr

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθ. 70573 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) RIPPER (clethodim 12% β/ο + pyraflufen-ethyl 1% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες και την προστασία των καταναλωτών»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

- Τις διατάξεις:
 - Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 - Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
- Τον κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 37,4 και 45 αυτού.
- Την αριθ. 108414/28.04.2025 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 2339/14.05.2025).
- Το αριθ. 12862/330936/07.12.2020 έγγραφο της Υπηρεσίας με θέμα «Διάθεση αποθεμάτων μετά από τροποποίηση αδειών διάθεσης στην αγορά».
- Την αριθ. 392905/11.12.2024 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθ. 70573 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) RIPPER (clethodim 12% β/ο + pyraflufen-ethyl 1% β/ο).
- Την από τον Ιούλιο του 2025 έκθεση αξιολόγησης των αρμόδιων αρχών του Κράτους Μέλους-εισηγητή Μάλτας για το προϊόν RIPPER (κωδ. προϊόντος SIP 31743).
- Την αριθ. 112217/30.04.2025 αίτηση και τα με αριθ. 205291/29.07.2025 συμπληρωματικά στοιχεία της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- Τροποποιούμε την αριθ. **70573** άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνο) RIPPER (clethodim 12% β/ο + pyraflufen-ethyl 1% β/ο), που χορηγήθηκε με την αριθ.

392905/11.12.2024 απόφασή μας, ως προς το φάσμα δράσης, τις δηλώσεις προφύλαξης, τις πρώτες βοήθειες και την προστασία των καταναλωτών.

Τα σημεία **5, 11, 12 και 13** διαμορφώνονται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης					
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος		Τρόπος και Χρόνος εφαρμογής	Μεγ. αριθ. εφαρμογών ανά καλ. περίοδο/ Μεσοδιάστημα (ημέρες)
		κ.εκ./ στρέμμα	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Αμπέλι VITVI (επιτραπέζιες και οινοποιήσιμες ποικιλίες)	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια* Αποξήρανση λαίμαργων βλαστών	200	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των καρπών. BBCH 00-79	1
Μηλοειδή Μηλιά MABSD Αχλαδιά PYUCO Κυδωνιά CYDOB Μουσμουλιά MSPGE Ιαπωνική μουσμουλιά ΕΙΟJA	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια* Αποξήρανση παραφυάδων	200	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για συγκομιδή. BBCH 00-87	1
Πυρηνόκαρπα Βερικοκιά PRNAR Ροδακινιά PRNPS Δαμασκηνιά PRNDO Κερασιά PRNAV	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια* Αποξήρανση παραφυάδων	200	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για συγκομιδή. BBCH 00-87	1
Εσπεριδοειδή Γκρέιπφρουτ CIDPA Πορτοκαλιά CIDSΙ Λεμονιά	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	200	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας που	2/20

CIDLI Λιμμετία (Πράσινα λεμόνια) CIDAF Μανταρινιά CIDRE	Αποξήρανση παραφυάδων			αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για κατανάλωση. (BBCH 00-89)	
Ακρόδρυα Αμυγδαλιά PRNDU	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	200	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για συγκομιδή. (BBCH 00-87)	2/20
Φουντουκιά CYLAV Καρυδιά IUGRE Καστανιά CSNSA	Αποξήρανση παραφυάδων				1
Ελιά OLVEU	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια* Αποξήρανση παραφυάδων	200	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για συγκομιδή. (BBCH 00-87)	2/20
Ακτινιδιά (πράσινα, κόκκινα, κίτρινα) ATIDE, ATICH	Ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια* Αποξήρανση παραφυάδων	200	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι την πλήρη ανάπτυξη των καρπών. (BBCH 00-79)	1
Ροδιά PUNGR	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια* Αποξήρανση παραφυάδων	200	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι την ωρίμαση των καρπών. BBCH 00-87	1

Λωτός DOSKA	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια* Αποξήρανση παραφυάδων	200	20-40	Κατευθυνόμενος ψεκασμός με χρήση προστατευτικών καλυπτρών στη γραμμή φύτευσης της καλλιέργειας ώστε να ψεκαστεί έως το 30% της καλλιεργούμενης επιφάνειας που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα. Από τον λήθαργο των βλαστοφόρων οφθαλμών μέχρι οι καρποί να είναι ώριμοι για συγκομιδή. (BBCH 00-87)	1
Αγροί σε αγρανάπαυση Όρια αγρών με ακαλλιέργητη γη	Ετήσια και πολυετή αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια*	200	20-40	Εντοπισμένη (spot) εφαρμογή με χρήση προστατευτικών καλυπτρών με μέγιστο ψεκασμένης έκτασης 30% που αντιστοιχεί σε μέγιστη δόση 60 κ.εκ. σκευάσματος/στρέμμα.	1 ανά 2 έτη

Παρατηρήσεις:

1. Η χρήση στη ροδακινιά περιλαμβάνει τη νεκταρινιά.
2. Η χρήση στην κερασιά περιλαμβάνει τη βυσσινιά.
3. Η χρήση στη μανταρινιά περιλαμβάνει την κλημεντίνη.
4. **Δεν επιτρέπεται η εφαρμογή στις πεσμένες στο έδαφος ελιές.**
5. **Οι ελιές που προορίζονται για παραγωγή ελαιολάδου, μπορούν να συλλεχθούν εάν πέσουν μετά την εφαρμογή του σκευάσματος. Σε περίπτωση πρόωρης πτώσης των ελιών μετά την εφαρμογή, πρέπει να συλλέγονται αμέσως για να αποφευχθεί η παρατεταμένη επαφή του καρπού με το έδαφος.**
6. Να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή στις ποικιλίες αμπελιού Κορινθιακή σταφίδα και Σουλτανίνα και στις ποικιλίες αχλαδιού Κρυστάλλι και Κοντούλα. Στις ποικιλίες αυτές δεν είναι αποδεδειγμένη η απουσία φυτοτοξικότητας.
7. Η εφαρμογή να γίνεται σε ζιζάνια που βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη. Απαιτείται επαρκές φύλλωμα για τη σωστή απορρόφηση του σκευάσματος.
8. Η εφαρμογή για αποξήρανση παραφυάδων ή λαίμαργων βλαστών να γίνεται όταν έχουν μήκος έως 10-20 εκ.
9. Ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος με καλύπτρα αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με οποιοδήποτε τμήμα της καλλιέργειας.
10. Συνιστάται η χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους.
11. Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα παρουσία ανέμου, όταν επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες, με χαμηλή ή υψηλή υγρασία ή όταν αναμένεται βροχόπτωση.

*ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΟΥΜΕΝΑ ΖΙΖΑΝΙΑ

- Αμπέλι

Ετήσια

Ευαίσθητα
Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA)
Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE)
Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)
Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris* - SENVU)
Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG)
Πόα κοινή (*Poa annua* - POAAN)
Σετάρια πράσινη (*Setaria viridis* - SETVI)

Πολυετή

Ευαίσθητα
Αγριάδα (*Cynodon dactylon* - CYNDA)
Ζωχός πολυετής (*Sonchus arvensis* - SONAR)
Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis* - CONAR)

- Μηλοειδή, Αγροί σε αγρανάπαυση, Όρια αγρών με ακαλλιέργητη γη

Ετήσια ζιζάνια

Ευαίσθητα

Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA)
 Αντράκλα (*Portulaca oleracea* - POROL)
 Βλήτο τραχύ (*Amaranthus retroflexus* - AMARE)
 Ελευσίνη (*Eleusine indica* - ELEIN)
 Ήρα πολύανθη (*Lolium multiflorum* - LOLMU)
 Καψέλλα (*Capsella bursa-pastoris* - CAPBP)
 Κόνυζα (*Erigeron canadensis* - ERICA)
 Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)
 Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris* - SENVU)
 Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG)
 Πόα κοινή (*Poa annua* - POAAN)
 Πολυκόμπι (*Polygonum aviculare* - POLAV)
 Σετάρια πράσινη (*Setaria viridis* - SETVI)

Πολυετή ζιζάνια

Ευαίσθητα

Αγριάδα (*Cynodon dactylon* - CYNDA)
 Αγριοράδικο (*Taraxacum officinale* - TAROF)
 Βέλιουρας (*Sorghum halepense* - SORHA)
 Ζωχός πολυετής (*Sonchus arvensis* - SONAR)

Μετρίως ευαίσθητα

Αγριοτρίφυλλο (*Trifolium repens* - TRFRE)

- Πυρηνόκαρπα

Ετήσια

Ευαίσθητα

Βερόνικα (*Veronica persica* - VERPE)
 Βρόμος (*Bromus sterilis* - BROST)
 Ήρα πολύανθη (*Lolium multiflorum* - LOLMU)
 Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)
 Πόα κοινή (*Poa annua* - POAAN)
 Στελλάρια (*Stellaria media* - STEME)
 Τσουκνίδα μικρή (*Urtica urens* - URTUR)

Πολυετή

Ευαίσθητα

Αγριοράδικο (*Taraxacum officinale* - TAROF)
 Ζωχός πολυετής (*Sonchus arvensis* - SONAR)
 Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis* - CONAR)

- Ελιά

Ετήσια

Ευαίσθητα

Ήρα πολύανθη (*Lolium multiflorum* - LOLMU)
 Λουβουδιά (*Chenopodium album* - CHEAL)
 Πράσινη σετάρια (*Setaria viridis* - SETVI)
 Αγριοτομάτα (*Solanum nigrum* - SOLNI)
 Κόνυζα (*Erigeron canadensis* - ERICA)
Erigeron bonariensis
 Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG)

Πολυετή

Ευαίσθητα

Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis* - CONAR)

- Ακτινιδιά

Ετήσια

Ευαίσθητα

Αιματόχορτο (*Digitaria sanguinalis* - DIGSA)
 Κόνυζα (*Erigeron canadensis* - ERICA)
Erigeron bonariensis
 Μουχρίτσα (*Echinochloa crus-galli* - ECHCG)

Πολυετή

Ευαίσθητα

Περιπλοκάδα (*Convolvulus arvensis* - CONAR)

• Εσπεριδοειδή

Ετήσια	Πολυετή
Ευαίσθητα	Ευαίσθητα
Αντράκλα (<i>Portulaca oleracea</i> - POROL)	Αγριάδα (<i>Cynodon dactylon</i> - CYNDA)
Ζωχός (<i>Sonchus oleraceus</i> - SONOL)	Βέλιουρας (<i>Sorghum halepense</i> - SORHA)
Μολόχα (<i>Malva sylvestris</i> - MALSI)	Ζωχός πολυετής (<i>Sonchus arvensis</i> - SONAR)
Μουχρίτσα (<i>Echinochloa crus-galli</i> - ECHCG)	Περιπλοκάδα (<i>Convolvulus arvensis</i> - CONAR)
Ξινολάπαθο (<i>Rumex acetosa</i> - RUMAC)	
Πόα κοινή (<i>Poa annua</i> - POAAN)	
Ρόκα άγρια (<i>Diploaxis erucoides</i> - DIPER)	
Μετρίως ευαίσθητα	
Αγριοβρώμη μεγάλη (<i>Avena sterilis</i> - AVEST)	
Αγριοκρίθαρο (<i>Hordeum murinum</i> - HORMU)	
Βρόμος (<i>Bromus sterilis</i> - BROST)	
Γεράνιο (<i>Geranium</i> sp. - GERSS)	
Κόνυζα (<i>Erigeron bonariensis</i> - ERICA)	
Οξαλίδα (<i>Oxalis acetosella</i> - OXAAC)	
Σετάρια πράσινη (<i>Setaria viridis</i> - SETVI)	

• Ακρόδρυα

Ετήσια	Πολυετή
Ευαίσθητα	Μετρίως ευαίσθητα
Καψέλλα (<i>Capsella bursa-pastoris</i> - CAPBP)	Αγριοτρίφυλλο (<i>Trifolium repens</i> - TRFRE)
Κοινή Πόα (<i>Poa annua</i> - POAAN)	

• Ροδιά

Ετήσια, Ευαίσθητα: Ήρα πολύανθη (*Lolium multiflorum* - LOLMU)

• Λωτός

Ετήσια, Ευαίσθητα: Σετάρια πράσινη (*Setaria viridis* - SETVI)

11

Δηλώσεις
προφύλαξης

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.

P261: Αποφεύγετε να αναπνέετε ατμούς/ εκνεφώματα.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Εφαρμογή με τρακτέρ: φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.

Εφαρμογή με ψεκαστικά μέσα χειρός: φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή του σκευάσματος.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1: Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. (Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.)

Spe3: Για να προστατέψετε τα αρθρόποδα μη στόχους σε οπωρώνες και αμπελώνες να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη.

- 10 μέτρων ή
- 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50%.

Spe3: Για να προστατέψετε τα φυτά μη στόχους να αφήσετε μια απέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από μη γεωργική γη.

Spe3: Για την προστασία των υδρόβιων οργανισμών τηρείτε από τα επιφανειακά ύδατα μια απέκαστη ζώνη προστασίας για την καλλιέργεια της ελιάς και της ακτινιδιάς:

- 14 μέτρων ή
- 10 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 50% ή
- 5 μέτρων σε συνδυασμό με χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 75% ή
- χρήση ακροφυσίων μείωσης της διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά 90%

12 Πρώτες βοήθειες - Αντίδοτο

P301+P310+P331: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

P302+P352+P333+P313+P362+P364: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλυθείτε με άφθονο σαπούνι και νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

P304 + P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

P312: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικό προϊόν (Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005)	Ημέρες
Αμπέλι (0151010, 0151020), Ακτινιδιά (0162010)	7
Μηλιά (0130010), Αχλαδιά (0130020) Κυδωνιά (0130030), Μουσμουλιά (0130040) Ιαπωνική μουσμουλιά (0130050) Κερασιά-Βυσσινιά (0140020) Γκρέιπφρουτ (0110010), Πορτοκαλιά (0110020), Λεμονιά (0110030) Μανταρινιά-Κλημεντίνη (0110050), Λιμμετία (0110040), Ροδιά (0163050) Λωτός (0161060), Ελιά (0402010)	10

Ροδακινιά-Νεκταρινιά (0140030) Δαμασκηνιά (0140040), Βερικοκιά (0140010)	14
Αμυγδαλιά (0120010), Καρυδιά (0120110) Φουντουκιά (0120060), Καστανιά (0120040)	20
Αγροί σε αγρανάπαυση Όρια αγρών με ακαλλιέργητη γη	--

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Η ετικέτα του σκευάσματος να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση.
2. Για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, επιτρέπεται η τοποθέτηση στις συσκευασίες του σκευάσματος της μέχρι σήμερα ισχύουσας ετικέτας.
3. Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στις συσκευασίες του σκευάσματος θα τοποθετείται υποχρεωτικά η νέα τροποποιημένη ετικέτα.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 392905/11.12.2024 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Γεωργίας»
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.**

ΧΡ. ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ